

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE ALL'INTERVENTO

1) Eseguire preparazione intestinale ai pazienti sottoposti ad interventi chirurgici per i quali nel post operatorio si preveda un prolungato periodo di allettamento o difficoltà nella mobilizzazione. Valutare anche condizioni di stipsi cronica intestinale. La prescrizione dell'enteroclisma e/o di farmaci per via orale in preparazione all'intervento chirurgico è di competenza medica.

2) Evitare la tricotomia in qualsiasi tipologia di intervento chirurgico.

Se assolutamente necessario eseguire la tricotomia adottare le seguenti indicazioni:

- utilizzare esclusivamente rasoi elettrici con testina monouso
- limitare la tricotomia alla sola area interessata dall'incisione chirurgica
- effettuare la tricotomia su cute adeguatamente pulita e deterata
- effettuare la tricotomia immediatamente prima di entrare in sala operatoria

E' assolutamente vietata l'esecuzione della tricotomia da parte del paziente al domicilio
(fornire indicazioni chiare nella fase di pre-ricovero).

3) Eseguire o far eseguire, a seconda delle condizioni di autonomia del paziente, una doccia preoperatoria con sapone normale la sera precedente o il mattino dell'intervento sia per interventi programmati (doccia al domicilio) che per interventi urgenti. Verificare che il paziente si sia deterato in modo efficace.

Le aree da osservare con attenzione sono:

- aree presso le pieghe cutanee (solco mammario, pieghe inguinali)
- area ombelicale
- aree interdigitali
- area perineale

In caso di non conformità ripetere la detersione.

Consigliare il taglio delle unghie, **rimuovere eventuale smalto e unghie artificiali e monili.**

La pulizia cutanea del sito chirurgico va garantita anche per gli interventi in urgenza.

Invitare il **paziente ad indossare un pigiama/camicia pulito dopo la doccia.**

Nel caso in cui non fosse disponibile un pigiama pulito, fornire un camicia dell'Azienda.

Sostituire la biancheria del letto (lenzuola, traverse, federe) dopo la doccia.

4) Praticare o far eseguire, a seconda delle condizioni di autonomia del paziente, detersione del cavo orale. Raccomandare di spazzolare sia i denti sia la lingua. E' sufficiente usare un normale dentifricio. Non occorrono collutori e disinfettanti del cavo orale.



**Procedura Generale Aziendale
PO GC-QU-RIC/RI ASL AL 004
Raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico
(ISC)**

**Mod. PG GC-QU-
RIC ASL AL
004/01
(rev. 0)**

- 5) Al momento di accompagnare il paziente presso il Blocco Operatorio:
- rimuovere protesi acustiche, protesi dentarie mobili e riporle negli appositi contenitori in luogo protetto
 - far indossare al paziente un camice monouso e una cuffia a copertura dei capelli
- 6) **Sostituire la biancheria del letto** (lenzuola, traverse, federe) dopo aver accompagnato il paziente presso il Blocco Operatorio.