

BUNDLE per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico



FASE pre-operatoria

1

Evitare la tricotomia.
Nel caso fosse indispensabile,
utilizzare un rasoio elettrico.



2

Somministrare l'antibiotico prima dell'incisione
per procedure chirurgiche ad alto rischio
o quando viene impiantato materiale protesico
e rispettare i tempi ottimali di somministrazione.

FASE intra-operatoria

3

Utilizzare antisettici a base di alcol
contenenti clorexidina gluconato
per la preparazione del sito chirurgico.



2x

4

Risomministrare l'antibiotico
per procedure prolungate
e in pazienti con grave perdita di sangue.

FASE post-operatoria

5

**Interrompere
la profilassi antibiotica**
dopo l'intervento.



dicembre 2024



RICORDA!
Pratica sempre l'igiene delle mani e usa i guanti in modo appropriato.

Approvato e condiviso da ACOI, AICO, AMCLI, ANIPIO, SIAARTI, SIC, SICE, SICPRE, SICUT, SIFO, SIM, SIMIT, SItI

progetto grafico • Servizio Comunicazione Scientifica, Istituto Superiore di Sanità

MISURE AGGIUNTIVE

Bundle per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico



DA VALUTARE SOLO DOPO L'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE INCLUSE NEL BUNDLE

FASE pre-operatoria



i Informare la persona candidata all'intervento sulla prevenzione delle ISC.

Effettuare screening e decolonizzazione delle persone colonizzate con *Staphylococcus aureus*.



FASE intra-operatoria



Eeguire appropriatamente l'antisepsi di mani/braccia del team chirurgico.

Mantenere la normotermia peri-operatoria con temperatura target $>36^{\circ}\text{C}$.



Mantenere il controllo glicemico intra-operatorio con livelli target di glucosio nel sangue $<150\text{ mg/dL}$ nelle 24-48 ore dopo l'intervento

dicembre 2024



RICORDA!
Pratica sempre l'igiene delle mani e usa i guanti in modo appropriato.